



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	TESSENDERLO KERLEY TURKEY TARIM VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	787
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	10615
Marka veya Ticari Adı(wardsa)	MANVERT TERRA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	TESSENDERLO KERLEY TURKEY TARIM VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat) SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Demir(Fe): 2, Suda Çözünür Mangan(Mn): 0,5, Suda Çözünür Çinko(Zn): 0,5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İthalat
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	1,22-4,88-6,1-12,2-24,4-36,6 Kg 1-4-5-10-20-30 Lt
Depolama Sıcaklığı	0/30 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Firma Beyanı, Klor İçeriği: % 0
Veriliş Nedeni	Ünvan Değişikliği Nedeni İle Yenileme
Bu belge 07/05/2019 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelere Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih: 09/01/2020


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

Demir (Fe - Sülfat), Manganez (Mn - Sülfat) ve Çinko (Zn - Sülfat)
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

MANVERT TERRA

EC FERTİLİZER

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR.
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.

GARANTİ EDİLEN ANALİZ

Suda Çözünür Demir (Fe)	%2.0
Suda Çözünür Manganez (Mn)	%0.5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0.5

Klor (Cl) İçeriği %0

MANVERT TERRA tamamı suda çözünen sıvı bir iz element bitki besin maddeleri karışımıdır.

KULLANIM TALİMATI VE DOZLARI

MANVERT TERRA her çeşit bitkide uygulanan sulama sistemleri ile (damlama, yağmurlama ve salma sulama) tatbik edilebilir.

FERTİGASYON

(damlama ve diğerleri - l/dekar)

Meyve Ağaçları	4-5 l/da	Çim	5-10 cc/m ²
Narenciye	4-5 l/da	Tütün	3-4 l/da
Bahçe Bitkileri	3.5-5 l/da	Pamuk	3-4 l/da
Bağ	40-50 cc/her omca	Mısır	3-4 l/da
Çilek	5-6 l/da	Şekerpancarı	3.5-4.5 l/da
Muz	5-6 l/da	Patates	3-4.5 l/da
Zeytin	4-4.5 l/da	Hububat	3-4 l/da

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir

MANVERT TERRA, BIOVERT S.L.'NİN TİCARİ MARKASIDIR

NET AĞIRLIK:

PARTİ NO:

SON KULLANIM TARİHİ: AMBALAJ ÜZERİNDEKİ

KİMYEVİ GÜBRE LİSANS NO: 787

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL NO: 10615



ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

ÜRETİCİ FIRMA

BIOVERT S.L.

Ctra LV-9224

25137 Corbins

Lleida

SPAIN

İthalatçı Firma

TESSENDERLO KERLEY TURKEY

TARIM VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Yolu,

Anızcıca Mezra Altı, No: 312

35730 Kemalpaşa / İZMİR

KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanım dozları bitkilerin yetiştirme devresi boyunca uygulanacak toplam doz miktarıdır. Uygulamalar haftalık veya aylık sulama programlarına göre bölünmüş dozlar halinde yapılmalıdır.

NARENCİYE'de salma sulama yapıyorsa baharda tomurcuk döneminde başlayıp 4-5 uygulama ile toplam 12 l/da doz tavsiye edilir.

MEYVE AĞAÇLARININ 4-5 l/da olan fertigasyon dozunun %50'si çiçeklenmeden 10 gün önce, %25'i 30 gün sonra ve %25'i meyve tutumundan 10 gün sonra uygulanır.

ÇİLEK'te 5-6 l/da olan fertigasyon dozunun ilk uygulaması 400-500 cc/da olarak dikimden 12-15 gün sonra yapılır. Aynı dozda ikinci uygulamanın çiçeklenme döneminde yapılması tavsiye edilir. Meyve tutumundan itibaren vejetatif gelişme sürecinde her 15-18 günde bir 500-700 cc/da (her 10'000 bitkiye) dozunda diğer bitki besleme maddeleriyle birlikte uygulanır.

SEBZELERDE 3.5-5 l/da olan fertigasyon dozunun da 10-12 gün ara ile yapılacak bölünmüş uygulamalar halinde verilmesi tavsiye edilir.

FOSFORLU GÜBRELERLE KARIŞTIRILMAMALIDIR.

TAŞIMA, DEPOLAMA VE KULLANIMDA İHTİYATİ TEDBİRLER

Ambalajın parçalanmasına neden olmayacak tarzda özenle taşınmalı, yükleme ve boşaltma işlemlerinde de aynı şekilde dikkatli olunmalıdır. Depolamada üstüste dört sıradan fazla dizilmemelidir. Depolama sıcaklığı 0-30°C arasında olmalıdır.

Kullanımda, gözlerle temas etmesinden kaçının. Emniyet için gözlük ya da yüz maskesi takmak gerekir. Cilde teması önlemek için plastik önlük, eldiven ve bot gibi uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

PRATİK İLK TEDAVİ MÜDAHALELERİ

Gözlerle ve ciltle temas halinde çok bol su ile yıkanmalıdır ve tahris varsa tıbbi müdahale gerekir. Yutma halinde su verip kusturmaya çalışmak ve hemen tıbbi müdahale gerekir. Kendinde olmayan bir kişiye kesinlikle ağızdan birşey verilmemelidir.

Piyasaya sunacağımız etiketinin aynısı olduğunu taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde, 4703 Sayılı Kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ediyoruz.

10.12.2019

OKULU FARM VE HAYVANCILIK EKİPMANLARI
GİYİLMİŞTİR
09.01.20.

TESSENDERLO KERLEY TURKEY
TAR. VE KİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Yolu
No: 312 Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0 232 878 00 93 - 94 Fax: 0 232 878 80 07
Kemalpaşa V.D. 965 013 8232
Şirket Vekili
Burak KİŞİN